


Уверенный контроль АД** 24/7 у пациентов с первых признаков поражения почек^{1,2}



Снижение прогрессирования
альбуминурии

на 70%*, 1,4



Способствуют снижению риска
развития терминальной хронической
почечной недостаточности

на 23%^{2,5,6}

✓ **ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕРДЦА И ПОЧЕК
у пациентов с артериальной гипертензией
и углеводными нарушениями⁷**

*При лечении Ирбесартаном у каждого 3-го пациента нормализовался уровень альбумина или снизился риск прогрессирования альбуминурии в протеинурию на 70%. **Артериальное давление.
1. Parving H., et al. // N. Engl. J. Med. 2001. Vol. 345. P. 870–878. 2. Lewis E.J., et al. // N. Engl. J. Med. 2001. Vol. 345. P. 861–860. 3. 3л.ресурс: URL: <https://portal.eaeunion.org/sites/commonprocesses/ru-ru/Pages/DrugRegistrationDetails.aspx>. Дата доступа: 18.12.2024. 4. Общая характеристика лекарственного препарата Апровель®, РУ: ЛП-№(000309)-(Pr-RU). 5. Общая характеристика лекарственного препарата Апроваस्क®, РУ: Jin-№(000238)-(Pr-RU). 6. Общая характеристика лекарственного препарата Коапровель®, РУ: Jin-№(004777)-(Pr-RU). 7. В исследовании Strutz F., Bramlage P., & Paar W.D. Effect of three months' treatment with irbesartan on blood and pulse pressure of hypertensive type 2 diabetic patients: open, observational study in 31 793 patients. Current Medical Research and Opinion. 2005. Vol. 21 (9). P. 1433–1440. URL: <https://doi.org/10.1185/030079905X61811> применение ирбесартана показало снижение артериального давления среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, а также сопутствующее снижение степени альбуминурии, гликированного гемоглобина и уровня глюкозы среди этих пациентов. Информация предназначена исключительно для медицинских и фармацевтических работников.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА